

Tukuma Straume elevators	Mitrums % (max)	Piemaisījumi % (max)	Proteīns % (min)	Lipeklis % (min)	Tilpummasa kg/hl (min)	Krišanas skaitlis (min.)	Dīgušie graudi % (max)	Citu graudu piemaisījumi % (max)
KVIEŠI								
Pārtikai Ekstra	23.0	-	14.5	30	78.0	280	1.0	2.0
Pārtikai 1. grupa	23.0	-	14.0	28	77.0	270	1.0	2.0
Pārtikai 2. grupa	23.0	-	12.5	25	76.0	250	1.0	2.0
Pārtikai 3. grupa	23.0	-	11.5	22	75.0	230	1.0	2.0
Lopbarībai	23.0	-	-	-	72.0	-	10.0	10.0
Lopbarībai B	23.0	-	-	-	68.0	-	10.0	10.0
Bāzes rādītājs %	14.0	1.0					6.0	5.0
MIEŽI								
Lopbarībai	23.0	-	-	-	62.0	-	10.0	10.0
Lopbarībai B	23.0	-	-	-	58.0	-	10.0	10.0
Bāzes rādītājs %	14.0	1.0					6.0	5.0
RAPSIS								
			Eļļa % (min)					
Biomasai	17.0	-	-		-	-	-	2.0
Bāzes rādītājs %	8.0	2.0						
RUDZI								
			Piemaisījumi (t.sk. "melnie graudi") % (max)		Tilpummasa kg/hl (min)	Krišanas skaitlis (min.)	Dīgušie graudi % (max)	Citu graudu piemaisījumi % (max)
Lopbarībai	23.0	-	0.10		68.0	-	1.0	10.0
Lopbarībai B	23.0	-	0.25		64.0	-	1.0	10.0
Bāzes rādītājs %	14.0	1.0						5.0

Bojāti, slimī un kaitēkļu inficēti graudi, kā arī graudi ar neatbilstošām smakām, krāsu vai piemaisījumiem netiek pieņemti. Ar fuzariozi, melnplauku inficēti graudi un dzīvi kaitēkļi nav pieļaujami.

Ieskaites svārs mitriem graudiem, rapsim un pupām tiek aprēķināts, atskaitot no neto svāra mitruma zudumus (X m.), ko aprēķina pēc formulas: $X m = (100(m_2 - m_1)) / (100 - m_1)$, kur m_2 - faktiskais mitrums, %, m_1 - bāzes mitrums, %.

Ieskaites svārs graudiem un rapsim, kam faktiskie piemaisījumi pārsniedz bāzes rādītāju, tiek aprēķināts, atskaitot no neto svāra piemaisījuma zudumus (X p.), ko aprēķina pēc formulas: $X p = p_2 - p_1$, kur p_2 - faktiskie piemaisījumi, p_1 - bāzes piemaisījumi, %.

***Kvalitātes rādītāji un grupu iedalījums var mainīties atkarībā no ražas gada specifikas.**