



## FUNGICIDAS

(I)

Bumper® 25 EC  
Bumperis 250 g/l k.e.

Registracijos Nr. 0165F/08

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo  
Partijos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo  
Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:  
Makhteshim-Agan Holland B.V.  
P.O.Box 355, 3830 AK Leusden,  
The Netherlands  
Tel.: (+31) (0) 33 445 3160  
Faks.: (+31) (0) 33 432 15 98

Atstovas Lietuvoje  
Tel.: +370 5 2108622

## FUNGICIDS

(IV)

Bumper® 25 EC  
Bumperis 25 e.k.

Darbīgā vielā: 250 g/l propikonazols

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs: 0133

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs: Skafit uz īepakojuma

Izgatavošanas datums: Skafit uz īepakojuma

Derīguma termins: 2 gadi oriģinālā neatvērtā

īepakojumā.

Reģistrācijas apliecības iņšķieks:

Makhteshim-Agan Holland B.V.  
P.O.Box 355, 3830 AK Leusden,  
The Netherlands

Tālr.: (+31) (0) 33 445 3160

Fakss: (+31) (0) 33 432 15 98

Ražotājs:

Makhteshim chemical works LTD firma  
P.O. Box 60 Beer - Sheva

Izraēla

® - firmas Makhteshim Chemical works LTD  
reģistrēta tirdzniecības zīme.

## FUNGITSIID

(EST)

Bumper® 25 EC

Fungitsiid

Taimekaitsevahend

Toimeaine: propikonasool 250 g/l

Preparatīvne toime: emulsjonikonsentrāt  
Lai tojimespektrīga fungitsiidi seenhāguste törjeks  
teravījal (kaer, oder, suvi-ja tallinu, rukis), kōreliste  
heitainede seemnepöldudel, golfimurul.

Bumper 25 EC-d võib osta ja kasutada ainult  
taimekaitsetunnistust omav isik.

Eesti registreerimistunnistus: 0259/17.09.04

Kehtiv kuni: 31.05.14

Sisaldbab ohtlikku ainet propikonasool, võib  
põhjustada allergiat.

Tootja: Makhteshim Agan Industries Ltd  
Häädaabi telefon 112

Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendilt

Tootja:

Makhteshim Chemical Works, Ltd  
P.O.B. 60 Beer Sheva ISRAEL 84100  
Tel: 972-8-6296714



97100680B/201210

Pakuotė: 5L



8 718077 000305

İepakojums: 5L



UN 3082

Pakend: 5L



Aplinkai pavojingas / Bīstams videi  
Keskonnahohtlik

169- OCT12-AB

**Bumper® 25 EC** (I)**Bumperis 250 g/l k.e.****Veiklioji medžiaga:** propiconazolas 250 g/l.**Koncentruota emulsija**

**Veikimo spektras:** triazolų grupės sisteminis platus veikimo spektrą fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinių kveičių bei vasarinių miežių pasėlių apsaugai nuo ligų.

**Skirtas profesionaliam naudojimui.****DÉMESIO!****Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.****Saugoti nuo vaikų.****Laikyti atokiuose nuo maisto, gérimum ir gyvulių pašaro.****Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.****Prarijuj nedelsiant kreipktis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.****Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalinotos.****Vengti patekimų į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).**

**Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 1 metrą iki paviršinių vandens telkiniių, jeigu nėra nustatytas kitoks apsauginis atstumas pagal paviršinių vandens telkiniių apsaugos zoną ir pakrančių apsaugos juostą nustatyta tvarkos apraša.**

**Neuzterštį vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio/vengti taršos per drenąžą iš sodybų ar nuo kelio).**

**PRIEŠ NAUDODAMĮ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!****SIEKIANT IŠVĒNTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS!****Bumper® 25EC** (IV)**Bumpers 25 e.k.****FUNGICIDS**

Sistēmas iedarbības aizsargājošs un ārstējošs fungicīds cīnai pret slimībām ziemas un vasaras kvešu, miežu un rudzu sējumos.

**BĪSTAMĪBA UN DROŠĪBAS PASĀKUMI:**

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ieglaičigū negativu ietekmi ūdens vidē.

Sārgāt no bēriņiem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Neešt, nedzert un nesmēkēt darbojties ar vielu.

Ja norūts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai markējumu.

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

Izmantot pieņēmto tvertni, lai izvarītos no vides piesārņošanas.

**Avarijs gadījumā zinot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**R51/53,S2,S13,S20/21,S46,S35,S57**

**PIRMĀ PALĪDŽĪBA:**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļūvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušā svagā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlams ārsta konsultāciju . Uzrādīt ārstan attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

**Saindešanās informācijas centra tālrupa numurs: 67042473.**

**Uzglabāšana.** Preparāts jāuzglabā oriģinālā, labi noslēgtā iepakojumā, sausās un labi vēdināmās noliktavās virs 0°C.

**Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasit un izpildit lietošanas instrukcijas prasības!**

**Bumper® 25 EC** (ES)**Fungitsiidi**

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb jälgida kasutusjuhendi nõudeid.

Mürgine veeorganismidele, vööb pöhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal sōõmine, joomine ja suitsutamine keelatud. Vältida silma sattumist.

Kemikaali allaneelamise korral põõrduva viivitamatult arsti poolle ja näidata talle pakendit või etiketti.

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

**LT**

## **NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS**

**Bumperis** 250 g/l k. e. platus spekto triazolų grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kvečių bei vasarinių miežių apsaugai nuo ligų. Efektyvus prieš septoriozę, rūdis, miltligę, dryžlių. Bumperis 250 g/l k.e. j augalą patenka per lapus bei stiebą ir pasklinda visame augale. Fungicidas yra biosintezės inhibitorius.

### **Preparatas naudojamas :**

žieminiuose kvečiuose	prieš septoriozę, geltonasias ir rudasias rūdis, miltligę.
vasariniuose kvečiuose	prieš septoriozę, miltligę, kvečių dryžlige, rudasias rūdis.
vasariniuose miežiuose	prieš tinkliškąją ir rudadémę dryžlige, rūdis, rhynchosporiozę, miltligę.

### **Naudojimo laikas ir normos**

Preparatas naudojamas pasirodžius pirmiesiems vienos iš aukščiau paminėtų ligų požymiu; esant reikalui dar kartą po 14-21 dienų.

### **Rekomenduojama preparato norma : 0,5 l/ha**

### **Rekomenduojama tirpalo norma : 250-300 l/ha**

### **Karencijos laikas - 30 dienų.**

### **Didžiausias purškimų skaičius - 2.**

### **Tirpalo ruošimas ir naudojimo technika**

Prieš naudojimą preparatą suplakti.  
Reikiama preparato kiekį supilkite į pusiau pripildytą vandeniu purkštuvu talpą, gerai sumaišykite. Junkite purkštuvu maišykle, supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite. Praplaukite kelis kartus tuščią tarą vandeniu ir supilkite į ją talpą su tirpalu.  
Maišykles neišjunkite viso purškimo metu.  
Padarius pertrauką purškimo metu, tirpalas turi būti pakartotinai gerai išmaišomas prieš purškimo pradžią.  
Baigę darbą, purkštuvą praplaukite vandeniu.

**Pastaba:** nenaudoti tuščios taros kitiems tikslams.

### **SAUGOS PRIEMONĖS**

Dévėkite apsauginius drabužius ir asmenines apsaugines priemones.  
Darbo metu ir preparato saugojimo vietose nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.  
Dirbkite tik gerai védinamose patalpose.  
Laiykites darbo su augalų apsaugos preparatais taisyklė.  
Baigę darbą, nusiprauskite su vandeniu ir muiliu, praskalaukite burnos ertmę bei persirenkitė.

### **ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS**

- **Kvėpavimo:** naudokite atitinkamas kvėpavimo apsaugos priemones (Filtros A-P2).
- **Odos:** dévėkite tinkamas apsauginius drabužius ir cheminėms medžiagoms atsparią alyvynę.
- **Rankų:** mūvėkite tinkamas pirštines atsparias cheminės priemonėms - neopreno arba nitriro guminas.
- **Akių:** naudokite apsauginius akinius arba veido apsaugą.

black BACK

**LAIKYMAS**

Laikyti tik originalioje sandariai uždarytoje taroje, sausoje gerai védinamoje patalpoje, pliusinėje temperatūroje.

Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gyvulių pašaro.

Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies.

Laikyti vaikams ir kitiams asmenims nesiekiamose vietose.

### **PIRMOJI PAGALBA**

**Prarijus,** duoti nukentėjusiam daug gerti pieno, kiaušinio baltymo ar želatinos tirpalo. Jei šiu produktu nėra, rekomenduojama duoti daug gerti. Negirdyti sąmonę praradusio nukentėjusiojo. Vėmimo sukelti negalima. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis,** plauti jas švariu vandeniu 10 min., kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos,** nusivilkti drabužius, odą nuplauti vandeniu su muiliu, kreiptis į gydytoją.

**Įkvėpus,** išnešti nukentėjusį į gryną orą, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

**Rekomendacijos gydytoju:** šiam preparatui priešnuodžio nėra. Išplauti skrandį, vengti skrandžio turinio patekimo į plaučius. Taikyti simptomatinį gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052**

### **TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS**

Ištuštiną ir vandeniu išplautą tuščią tarą sunaikinkite galiojančius teisės aktų reikalavimus. Paplavas supilkite į purkštuvu talpą ir išpurkškite.

### **PASTABA**

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

**LV**

### **PIRMĀ PALĪDŽĪBA**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā ar ziedēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietišo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārstā konsultācija. Uzrädiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

**Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473.**

### **PIELIETOŠANA**

Bampers 25 e.k. ir plaša iedarbības spektra fungicids cīnai pret slimibām ziemas un vasaras kvešu, miežu un rudzu sejumos.

### **Pielietojamās normas un apstrādes laiks**

Ziemas kveši, vasaras kveši, mieži, rudzi.

Preparātu lieto sekojošu slimibū apkarošanai: graudaugu miltrasa (*Erysiphe graminis*), graudzāļu brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), graudzāļu dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), kvešu lapu pelēkplankumainiba (*Septoria tritici*), kvešu plēkšņu plankumainiba (*Septoria nodorum*), stiebzāļu

**LAIKYMAS**

Laikyti tik originalioje sandariai uždarytoje taroje, sausoje gerai védinamoje patalpoje, pliusinėje temperatūroje.

Apsmidzina sejumus vejetācijas periodā, parādoties slimibū pirmajām pazīmēm. Atkārtota apstrāde pēc 2-3 nedēļām.

Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gyvulių pašaro.

Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies.

Laikyti vaikams ir kitiem asmenims nesiekiamose vietose.

### **Maksimālais apstrāžu skaits - 2 reizes sezonā.**

### **DARBA ŠĶIDRUMA PAGATAVOŠANA UN SMIDINĀŠANAS TEHNika**

Pirms pielietošanas kanninas saturu saskalot. Vajadzīgo preparāta daudzumu pie ieslēgtā maisītāja liet smidzinātāja tvertnē, kura līdz pusei ir piepildīta ar ūdeni. Pēc tam pieliet pārējo ūdens daudzumu un rūpīgi samaisīt.

Tukšo taru 2 reizes izskalot ar ūdeni, izskaloto šķidrumu liet smidzinātāja tvertnē – pievienot darba šķidrumam.

Tiek rekomendēts lietot 300 l/ha darba šķidruma.

Ja smidzināšanas darba gaitā rodas pārtraukums, pirms darba atsākšanas darba šķidrums smidzinātāja tvertnē jāsamaisa.

Smidzināšanas darba laikā nav pieļaujamas:

### **-pārsedzes (tajā skaitā arī pie traktora apgriešanas lauka galā).**

### **PERSONĀLA DROŠĪBA**

Jāsargā, lai preparatis nenokļūtu acīs, uz ādas vai apērba. Strādājot ar preparātu lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtēpu, aizsargbrilles, respiratoru, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Iķeiz pēc darba rūpīgi jānomazgājas. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotira – jāmazgā.

### **VIDES AIZSARDZĪBA**

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaičigu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārñošanas.

Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" ietvertā likuma prasības un rekomendācijas.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārnoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

### **UZGLABĀŠANA**

Preparāts jāuzglabā oriģinālā, labi noslēgtā iepakojumā, sausās un labi ventilējamās noliktavās virs 0°C, atsevišķi no pārīkās produktiem, lopbarības, sadzīves traukiem, sildierīcēm un atklātas uguns, vietās, kuras nav pieejamas nekompetentām personām, it īpaši bērniem.

**DERIGUMA TERMINĀS:** 2 gadi oriģinālā neatvērtā iepakojumā.

### **IEPAKOJUMA LIKVIDĒŠANA**

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidē drošā veidā . Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

### **PIELIETOJAMĀS NORMAS UN APSTRĀDES LAIKS**

Ziemas kveši, vasaras kveši, mieži, rudzi.

Preparātu lieto sekojošu slimibū apkarošanai: graudaugu miltrasa (*Erysiphe graminis*), graudzāļu brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), graudzāļu dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), kvešu lapu pelēkplankumainiba (*Septoria tritici*), kvešu plēkšņu plankumainiba (*Septoria nodorum*), stiebzāļu

**EST**

### **Taara purunemine**

Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult läbi imbuund. Seejärel koguda materjal spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete kättejale.

### **Taara kahjustumine**

Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutatud pakendid koguda kokku ja anda jäätmete kättejale.

### **Hoiustamine**

Hoida kuivas ja jahedas, kinnises originaalpakendis ja etiketiga vastavalt. Hoida eemal toiduaine-test, joogist ja loomasöödast. Öigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 5 aastat. Hoida külmu-mise eest. Säilitamiseks sobib temperatuur mille alla -10°C ja üle +30°C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 meetrit, et vältida taara kahjustamist.

### **Ettevaatusabinõud**

Preparaadi töötades täita tööhutuse eeskirju. Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist seebi ja veega. Vältida preparaadi nahale ja silma sattumist ning pritsimissudu sissehingamist. Töötamise ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada.

### **Ravi abinõud**

Esmabi, saastest puhastamine, sümpomaatiline ravi. Spetsifilist antidooti (vastumürki) ei ole teada.

### **Esmaabi**

Preparaadi nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga. Silma sattumisel loputada kiiresti voolava vee all 15 minutit (silmalaud avatult). Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poolle. Pritsimissudu sissehingamise korral toimetada kannatanu värskse öhu kätte. Vajadusel teha kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poolle.

### **Keskkonnoahtlikkus**

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisaatiioni.

### **Toimemehhanism**

Preparaat toimib juba haigestunud taimedelev ravivalt, törjub haigustekitajat nakatumise ajal ja mõjub profülaktiliselt, aidates ära hoida uut nakatumist.

### **Toimespektor**

#### **Teraviljal**

*Puccinia striiformis* (nisu kollane rooste)

*Puccinia tritici* (rukki leherooste)

*Puccinia hordei* (odra leherooste)

*Puccinia graminis* (harilik körrooste)

*Erysiphe graminis* (körreliste jahukaste)

Fusarium spp. (fusarioosid)  
 Helminkthosporium spp. (körreliste laiksused)  
 Pseudocereosporella herpotrichoides (silmalaiksus)  
 Pyrenophora teres (odra-vörklaiksus)  
 Rhynchosporium secalis (äärislaiksus)  
 Septoria nodorum (helelaiksus viljapeades)  
 Septoria tritici (helelaiksus lehtedel)

**Kasutusjuhend**

Parim tulemus saadakse pritsimisel haiguse varases staadiumis.

**Talinisu:** jahukaste, fusarioosi, körreliste rooste ning laiksuste törjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel lipulehe faasis. Kui selles staadiumis esineb haigust väga vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise lõpuni.

**Suvinius:** jahukaste, fusarioosi, körreliste rooste ning laiksuste törjeks pritsida haiguse ilmumisel teise körresõlme moodustumisest kuni lipuleheni. Kui selles staadiumis esineb haigust vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise lõpuni.

**Oder:** jahukaste, körreliste rooste ning laiksuste törjeks pritsida haiguse ilmumisel teise körresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.

**Kaer:** jahukaste, körreliste rooste ning laiksuste törjeks pritsida haiguse ilmumisel teise körresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.

**Talirukis:** jahukaste, körreliste rooste ning laiksuste törjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel teise körresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.

**Kulunormid:**

**Talinisu, suvinisu, oder, kaer, talirukis ja körreliste heintaimede seemnepöllul 0,5 l/ha**

**Golfimuru 1,0 l/ha**

**Ooteaeg:** teraviljal 30 päeva, körreliste heintaimede seemnepöllul 20 päeva.

**Tööode:** golfimurul 5 päeva.

**Veekulu:** 200-300 l/ha

**Pritsimiskordi:** 1 pritsimine aastas, golfimurul maksimaalselt 2 korda aastas.

**Pritsimislahuse valmistamine:**

Enne tööleasumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut.

Täita 1/3 paaki puhta veega, seejärel lülita sisse segisti ning lisä vajalik kogus preparati ning lõpuks ülejää nud veekogus.

**Pritsi puhastamine**

Tühjenda paak. Peale pritsimise lõpetamist pese paak, jaotustorud, voolikud. Selleks võib kasutada soodat 2-4 kg 100 l vee kohta.

**Segatavas teiste preparaadiga**

Bumper 25 EC on segatav enamike taimekaitsevahenditega. Segamisel tuleb jälgida mõlema segupreparaadi kasutusjuhendit ja veenduda, et kultuur on pritsimiseks õiges kasvustaaadiumis.

Täpsemate soovitustega saamiseks võib olla Eestisse toimetaja firma või tema edasimüüja poole.

**Tählepanu!**

Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse.

Firma ei vastuta erinevate törjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha.

**Importētāja pārstāvis Latvijā:**

**SIA Baltic Agro**

Lielirbes iela 32A,

Riga LV-1046, Latvija

Tarl.: +371 6 7228851, Fakss.: +371 6 7830280

**DÉMESIO!**

Labi toksiskas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemū pakitimus.

**SIA Laffert**

Station Iecava, Iecava

Bauska region, Latvija

Tarl.: +371 63941541, Fakss: +371 63941955

**k/s Latraps**

Dobeles iela 41,

Jelgava, Latvija, LV-3001

Tarl.: +371 6 3025931, Fakss: +371 6 3025908

**SIA "Scandagria Latvia"**

Turaidas iela 24,

LV-3402, Liepāja, Latvija

Tarl.: +371 6 3407196, Fakss: +371 6 3407197

**Bamper® 25 EC**

**FUNGICIDS**

Sistēmas ledarības aizsargājošs un ārstējošs fungicids cīnai pret slimībām ziemas un vasaras kvešu, miežu un rudzu sējumos.

**BISTAMĪBA UN DROŠĪBAS PASĀKUMI:**

Toksiķis uders organismiem, var radīt ieglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Sargā no bēriņiem.

Neuzglabāt kopā ar pārtīku vai dzīvnieku barību.

Neēst, nedzert un nesmēķēt darbojties ar vielu.

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību ja uzrādīt iepakojumu vai markējumu.

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piešāmošanas.

**Avarījus gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**R51/53,S2,S13,S20/21,S46,S35,S57**

**PIRMĀ PALĪDZĪBA:**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokluvis uz ādas, nekavējoties magzgāt to tekoša ūdens strūklā ar zlepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acis, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, izdert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis sveigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlām ārstā konsultāciju. Uzrädiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

**Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473.**

**Uzglabāšana:** Preparāts jāuzglabā oriģinālā, labi noslēgtā iepakojumā, sausās ja labi vēdināmās noliktavās virs 0°C.

**Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!**

**Bumper® 25 EC**

**Fungitsiidi**

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonale tuleb jälgida kasutusjuhendi nõudeid.

Mūrgine veerorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasööst.

Käitlemise ajal sõõmine, joomine ja suitsatamine keelatud. Vältida silma sattumist.

Kemikaali alllaneelamise korral põõrduda viivitamatult ärsti poolle ja naidida talle pakendit või etiketti.

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

1699-OCT12-AF

+ +

150x272.5mm

+ +



## FUNGICIDAS

## FUNGICIDS

## FUNGITSIID



Bumper® 25 EC  
Bumperis 250 g/l k.e.

Registracijos Nr. 0165F/08  
Pagaminimo data: Žiūrėti ant  
jpakavimo  
Partijos Nr.: Žiūrėti ant jpakavimo  
Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:  
Makhteshim-Agan Holland B.V.  
P.O.Box 355, 3830 AK Leusden,  
The Netherlands  
Tel.: (+31) (0) 33 445 3160  
Faks.: (+31) (0) 33 432 15 98

Atstovas Lietuvoje  
Tel.: +370 5 2108622

Bumper® 25 EC  
Bambers 25 e.k.

Darbiš viela: 250 g/l propikonazols  
Preparatišva forma: emulsijas koncentrāts  
Reģistrācijas numurs: 0133  
Reģistrācijas klase: 2  
Partijas numurs: Skafit uz iepakojuma  
Izgatavošanas datums: Skafit uz iepakojuma  
Derīguma termins: 2 gadi oriģinālā neatvērtā  
iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:  
Makhteshim-Agan Holland B.V.  
P.O.Box 355, 3830 AK Leusden,  
The Netherlands  
Tālr.: (+31) (0) 33 445 3160  
Faks: (+31) (0) 33 432 15 98

Ražotājs:  
Makhteshim chemical works LTD firma  
P.O. Box 60 Beer - Sheva  
Izraēla  
\* - firmas Makhteshim Chemical works LTD  
registrēta tirdzniecības zīme.

Bumper® 25 EC  
Fungitsiid  
Taimekaitsevahend

Toimeaine: propikonasols 250 g/l  
Preparatišve toime: emulsjoonikonsentraat  
Laija toimespektīga fungitsiidi seenhāgustē törjeks teraviljal (kaer,  
oder, suvi-ja talinu, rukis), korreliste heintaimede seemnepöldudel,  
golfmūru.

Bumper 25 EC-d vōib osta ja kasutada ainult  
taimekaitsetunnistust omav isik.

Eesti regiistreerimistunnistus: 0259/17.09.04  
Kehtiv kuni: 31.05.14  
Sisaldbt ohtlikku ainet propikonasool, vōib  
pöhjustada allergiat.  
Tootja: Makhteshim Agan Industries Ltd  
Hädaabi telefon 112  
Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendit

Tootja:  
Makhteshim Chemical Works, Ltd  
P.O.B. 60 Beer Sheva ISRAEL 84100  
Tel: 972-8-6296714

Bumper® 25 EC

Bumperis 250 g/l k.e.

Veiklioji medziaga: propikonazolas 250 g/l.  
Koncentruota emulsija

Veikimo spektrs: trätzoli grupēs sisteminis platus veikimo spektra fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinių kvečių bei vasarinių miežių pasėlių apsaugai nuo ligų.  
Skirtas profesionaliam naudojimui.

### DĒMESIO!

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaiku.

Laiķi atokiau nuo maisto, gērimu ir gyvuliu pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Pranju nedelsiant kreipkitis į gydytoją ir parodyti šią pakuetot arba etiketę. Atliekos ir pakuetot turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specjaliomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 1 metrą iki paviršinių vandens telkinii, jeigu nėra nustatytas kitoks apsauginis atstumas pagal paviršinių vandens telkinį apsaugos zoną ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą.

Neuzteršt vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (Neplauti purškinių i renginių šalia paviršinio vandens telkinio/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

### RIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS

Bumper® 25 EC

Bambers 25 e.k.  
FUNGICIDS

Sistēmas iedarbības aizsargājošs un ārstējošs fungicids ciņai pret slimībām ziemas un vasaras kviešu, miežu un rudzu sējumos.

### BISTAMIĀ UN DROŠĪBAS PASĀKUMI:

Toksisks īdens organismiem, var radīt ieglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Sargāt no bēriem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Neest, nedzert un nesmēķēt darbojties ar vielu.

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai markējumu.

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidē drošā veidā.

Izmantot pieņērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Avārijas gadījumā zinot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

R51753,S2,S13,S20/21,346,S35,S57

Uzglabāšana. Preparatis jāuzglabā oriģinālā, labi noslēgtā iepakojumā, sausās un labi vēdināmās noliktavās virs 0°C.

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Importētāja pārstāvis Latvijā:

SIA Baltic Agro Lielirbes iela 32A, Riga LV-1046, Latvija. Tālr.: +371 6 7228851, Faks: +371 6 7830280

SIA Latfer Station Iecava, Iecava, Bauska region, Latvija, Tālr.: +371 63941541, Faks: +371 63941955

k/s Latraps Dobelei iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001, Tālr.: +371 6 3025931, Faks: +371 6 3025908

SIA Scandagria Latvia Turaidas iela 24, LV-3402, Liepaja, Latvija, Tālr.: +371 6 3407196, Faks: +371 6 3407197

SIA Litgraga Langervaldes iela 2, Cenu pag., Jelgavas reg. LV-3042, Latvija Tālr.: +371 6 3045285, Faks: +371 6 3045283

Bumper® 25 EC

Fungitsiid

Vältimaks ohtu inimeseile ja keskkonale tuleb jälgidala kasutusjuhendi nõudeid.

Mūrgine veeorganismidele, vōib pöhjustada pikaajalist vesikeskondka kahjustavat toimet.

Hoida lastele kāttesaamatus kohas.

Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal sōõmine, joomine ja suitsetamine keelatud. Vältida silma sattumist.

Kemikalii allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poolle ja näidata talle pakendit või etiketti.

Vältida kemikalii sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

Maaletaja ja turustaja:

Farm Plant Eesti AS, Tähe 13, 71012 Viljandi, Estonia, Tel.: +372 479 6166, Fax: +372 479 6657

AS Baltic Agro, Peterbu 44-20, Tallinn, Estonia, Tel.: +372 606 2260, Fax: +372 606

Litgraga OÜ, Maakri 44-20, Tallinn, Eesti, Tel: +372 5112896



+ +

+ +