

Orius® 250 EW  
Fungicīds

Sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds slimību apkarošanai un ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, ziemas un vasaras miežu un auzu, ziemas un vasaras rapša sējumos.

Darbīgā viela: tebukonazols 250 g/L  
Preparatīvā forma: emulsija ūdenī  
Reģistrācijas Nr.: 0267  
Reģistrācijas klase: 2.  
Iepakojums: 2 x 10 L, 4 x 5 L, 12 x 1 L  
Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma  
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

APSTIPRINU  
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļas vadītāja  
R. Čudere  
20/6/03 "augusta" 



Uzmanību

H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H361d	Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401	Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību.
P201	Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P305 + P351+ P338	SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediku palīdzību.
P308 + P313	Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediku palīdzību.
P337 + P313	Atbrīvoties no saturu/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
P501	Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SP1	Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
SPe3	Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

**Uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt sausā un labi vēdināmā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 40 °C.

**Derīguma termiņš**

2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese**

ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden  
Nederlande

**SANEMTS N. 568**  
Valsts augu aizsardzības dienesta  
Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas daļā  
20 16. g. 3. " augusta"

Tālr.: +31 33 44 53160

[www.adama.com](http://www.adama.com)

**Ražotājs un tā adrese**

ADAMA Makhteshim Ltd  
P.O. Box 60  
Ind. Zone, Be'er Sheva 84110  
Izraēla

**Pārstāvniecība Latvijā**

Tālr.: +371 29446285

**Orius® 250 EW  
Fungicīds**

Sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds slimību apkarošanai un ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, ziemas un vasaras miežu un auzu, ziemas un vasaras rapša sējumos.

**Darbīgā viela:** tebukonazols 250 g/L

**Preparatīvā forma:** emulsija ūdenī

**Reģistrācijas Nr.:** 0267

**Reģistrācijas klase:** 2.

**Iepakojums:** 1 L, 5 L, 10 L

**Partijas Nr.:** skait uz iepakojuma

**Izgatavošanas datums:** skait uz iepakojuma



**Uzmanību**

**H319**

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

**H361d**

Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.

**H410**

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**EUH401**

Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību.

**P201**

Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

**P280**

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

**P305 + P351+ P338**

SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

**P308 + P313**

Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediku palīdzību.

**P337 + P313**

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediku palīdzību.

**P501**

Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

**SP1**

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

**SPe3**

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

**Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt sausā un labi vēdināmā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 40 °C.

**Derīguma termiņš**

2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

**Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese**

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden

Nīderlande

Tālr.: +31 33 44 53160  
www.adama.com

**Ražotājs un tā adrese**  
ADAMA Makhteshim Ltd  
P.O. Box 60  
Ind. Zone, Be'er Sheva 84110  
Izraēla

**Pārstāvniecība Latvijā**  
Tālr.: +371 29446285

## PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.  
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzeriet 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473.

## DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles, gumijas cimdus un slēgtus apavus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

## PREPARĀTA APRAKSTS

Orius® 250 EW ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds ar divu līdz četru nedēļu ilgstošu pēciedarbību. Preparātam piemīt kā aizsargājošas īpašības - lieto pirms slimības parādīšanās (pēc prognozes), tā arī ārstējošās īpašības lieto, parādoties slimības pirmajām pazīmēm.

### Orius® 250 EW efektivitāte slimību ierobežošanā

Slimības	Ziemas kvieši	Vasaras kvieši	Ziemas mieži	Vasaras mieži	Rudzi	Auzas	Ziemas rapsis, vasaras rapsis
<b>Graudzāļu miltrasa</b> <i>Blumeria graminis</i>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
<b>Lapu pelēkplankumainība</b> <i>Septoria tritici</i>	XX	XX					
<b>Kviešu plēķšņu plankumainība</b> <i>Septoria nodorum</i>	XXX	XXX					

<b>Brūnā rūsa</b> <i>Puccinia recondita</i>	XXX	XXX			XXX		
<b>Dzeltenā rūsa</b> <i>Puccinia striiformis</i>	XXX	XXX					
<b>Miežu lapu tīklplankumainība</b> <i>Pyrenophora teres</i>			XX	XX			
<b>Miežu pundurrūsa</b> <i>Puccinia hordei</i>			XXX	XXX			
<b>Auzu vainagrūsa</b> <i>Puccinia coronata</i>						XXX	
<b>Stiebrzāļu gredzenplankumainība</b> <i>Rhynchosporium secalis</i>			XX	XX	XX		
<b>Vārpū fuzarioze</b> <i>Fusarium spp.</i>	XX	XX	XX	XX	XX		
<b>Krustziežu sausā puve</b> <i>Phoma lingam</i>							XXX
<b>Tumšplankumainība</b> <i>Alternaria brassicae</i>							XX
<b>Pelēkā puve</b> <i>Botrytis cinerea</i>							XX
<b>Baltā puve</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>							XX

XXX - labi ierobežo (efektivitāte >80%);

XX – vidēji ierobežo (efektivitāte 60-80%)

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Deva, L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Graudzāļu miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), kviešu lapu pelēkplankumainība ( <i>Septoria tritici</i> ), kviešu plēkšņu plankumainība ( <i>Septoria nodorum</i> ), brūnā rūsa ( <i>Puccinia recondita</i> ), dzeltenā rūsa ( <i>Puccinia striiformis</i> )	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpū fuzarioze ( <i>Fusarium spp.</i> )	1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma		

			līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Graudzāļu miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), miežu lapu tīklplankumainība ( <i>Pyrenophora teres</i> ), stiebrzāļu gredzenplankumainība ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), pundurrūsa <i>Puccinia hordei</i> )	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30-65)	35	1
	Vārpju fuzarioze ( <i>Fusarium spp.</i> )	1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 60-65)		
Rudzi	Graudzāļu miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), stiebrzāļu gredzenplankumainība ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), brūnā rūsa <i>(Puccinia recondita)</i>	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS 30-69)	35	1
	Vārpju fuzarioze ( <i>Fusarium spp.</i> )	1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot no graudaugu ziedēšanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60-69)		
Auzas	Graudzāļu miltrasa ( <i>Blumeria graminis</i> ), auzu vainagrūsa <i>(Puccina coronata)</i>	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšana fāzes vidum (AS 30-65)	35	1
Ziemas rapsis	Krustziežu sausā puve ( <i>Phoma lingam</i> )	0.5	Apsmidzināt sējumus rudenī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas	56	1
	Krustziežu sausā puve ( <i>Phoma lingam</i> )	1.0	Apsmidzināt sējumus pavasarī, parādoties	56	1

			slimības pirmajām pazīmēm, līdz ziedēšanas sākumam (AS 60)		
	Krustziežu sausplankumainība <i>(Alternaria brassicae)</i>	1.0	Apsmidzināt sējumus pavasarī, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, līdz ziedēšanas beigām (AS 69)		
	Baltā puve <i>(Sclerotinia sclerotiorum)</i> , pelēkā puve <i>(Botrytis cinerea)</i>	1.0	Apsmidzināt sējumus kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapīnu nobiršanai (AS 65)		
Vasaras rapsis	Krustziežu sausā puve <i>(Phoma lingam)</i>	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 14-60)	56	1
	Krustziežu sausplankumainība <i>(Alternaria brassicae)</i>	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no 4 lapu stadijas līdz ziedēšanas beigām (AS 14-69)		
	Baltā puve <i>(Sclerotinia sclerotiorum)</i> , pelēkā puve <i>(Botrytis cinerea)</i>	1.0	Apsmidzināt kultūrauga pilnā ziedēšanas stadijā, sākoties ziedlapīnu nobiršanai (AS 65)		

Ziemas rapša sējumu smidzinājums rudenī no 4 lapu līdz 8 lapu stadijai nostiprina kultūrauga ziemcietību.

**Optimālais darba šķidruma daudzums:** graudaugu sējumos 200-300 L/ha,  
rapša sējumos 200-400 L/ha atkarībā no rapša sējuma biezības un augstuma.

#### Piezīme

Lietojot ieteiktajās devās, Orius® 250 EW nav fitotoksisks. Veicot apstrādi kultūraugiem nelabvēlīgos laika apstākļos (zems relatīvais gaisa mitrums, gaisa t° zem +12°C vai virs +25°C), iespējama lapu viegla dzeltēšana - hloroze, kas vēlāk izzūd, neietekmējot ražas iznākumu.

#### SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Orius® 250 EW drīkst lietot tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, herbicīdiem, insekticīdiem, minerālajiem mēslošanas līdzekļiem un augšanas regulatoriem. Gatavojojot maisījumus tvertnē, stingri

ievērojiet attiecīgo preparātu ražotājfirmu ieteikumus un pārliecinieties par attiecīgās kultūrauga šķirnes jutīgumu. Šaubu gadījumā vienmēr jākonsultējas ar speciālistu.

## DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Uzsākot darbu, rūpīgi iztīriet smidzinātāja iekārtu. Smidzinātāja tvertnē iepildiet 1/2 no vajadzīgā ūdens daudzuma. Saskaļojiet preparātu. Ieslēdziet maisītāju un pievienojet nepieciešamo preparāta daudzumu. Nepārtraucot maisīšanu, pievienojet pārējo ūdens daudzumu. Iztukšoto taru izskalojiet ar ūdeni. Skalojamo ūdeni pievienojet darba šķidrumam. Neizslēdziet maisītāju līdz darba beigām. Izlietojiet pagatavoto darba šķidrumu tūlīt pēc sagatavošanas.

## SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojet smidzinātāja tvertni un izmazgājet ar tīru ūdeni. Izskalojiet tvertni, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm.
- Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šķūtenēm.
- Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm pilnībā, iztukšojot tvertni.
- Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

## TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Pēc preparāta izmantošanas tukšā tara 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni. Tukšās kannas aizliegts izmantot atkārtoti. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

## VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpu un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

## UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt sausā un labi vēdināmā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas temperatūra no 0 °C līdz + 40 °C.

## DERĪGUMA TERMINŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

## **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē savā preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta uzglabāšana un lietošana ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, saistītu risku uzņemas lietotājs.