

Tango® Super

Fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos

Reģistrācijas Nr.	0110
Reģistrācijas klase:	2.
Darbīgās vielas:	epoksikonazols 84 g/l fenpropimorfis 250 g/l
Formulācija:	suspo-emulsija
Iepakojums:	5 l; 10 l

Preparāta apraksts

Tango Super sastāvā ir divas darbīgās vielas, kuras tiek uzņemtas augā un pārvietojas pa vadaudu sistēmu virzienā uz augšu. Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela, kura ir īpaši efektīva pret graudaugu rūsām, kā arī lapu un vārpju plankumainībām. Fenpropimorfis ir morfolīnu grupas darbīgā viela, kura ir īpaši efektīva pret graudzāļu miltrasu. Šo abu darbīgo

vielu kombinācija nodrošina fungicīda Tango Super ārstējošu un aizsargājošu iedarbību pret visām galvenajām graudaugu slimībām. Tango Super raksturīga ļoti ātra darbīgo vielu iekļūšana augā, kas nodrošina strauju slimību ierosinātāju attīstības ierobežošanu. Vislabākos rezultātus var iegūt, lietojot preparātu agrīnās slimību attīstības stadijās.

Lietošana

Ziemas un vasaras kviešu sējumos Tango Super ir efektīvs pret:

graudzāļu miltrasu (<i>Blumeria graminis</i>),
kviešu dzeltenplankumainību (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>),
kviešu lapu pelēkplankumainību (<i>Septoria tritici</i>),
kviešu plēkšņu plankumainību (<i>Septoria nodorum</i>),
graudzāļu dzelteno rūsu (<i>Puccinia striiformis</i>),
graudzāļu brūno rūsu (<i>Puccinia recondita</i>).

Devas divreizējas apstrādes gadījumā:

Pirmā apstrāde: 0,75 l/ha Tango Super lietot, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no kviešu stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādišanās stadijai (AS 30–37).

Otrā apstrāde: 0,75–1,5 l/ha Tango Super, sākot no attīstītās karoglapas stadijas līdz ziedēšanas beigām (AS 39–69).

Deva vienreizējas apstrādes gadījumā: **0,75–1,5 l/ha** Tango Super. Apstrādāt sējumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no kviešu karoglapas parādišanās stadijas līdz ziedēšanas sākumam (AS 37–61).

Tritkāles sējumos

Tango Super ir efektīvs pret:

- graudzāļu miltrasu (*Blumeria graminis*),
- kviešu dzeltenplankumainību (*Pyrenophora tritici-repentis*),
- kviešu lapu pelēkplankumainību (*Septoria tritici*),
- kviešu plēkšņu plankumainību (*Septoria nodorum*),
- graudzāļu dzelteno rūsu (*Puccinia striiformis*),
- graudzāļu brūno rūsu (*Puccinia recondita*),
- stiebrzāļu gredzenplankumainību (*Rhynchosporium secalis*).

Deva: 0,75–1,5 l/ha. Apstrādāt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no tritikāles pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas maksts atvēršanās stadijai (AS 31–49).

Rudzu sējumos

Tango Super ir efektīvs pret:

- graudzāļu miltrasu (*Blumeria graminis*),
- graudzāļu brūno rūsu (*Puccinia recondita*),
- stiebrzāļu gredzenplankumainību (*Rhynchosporium secalis*).

Deva: 0,75–1,5 l/ha. Apstrādāt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no rudzu pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas maksts atvēršanās stadijai (AS 31–49).

Miežu sējumos

Tango Super ir efektīvs pret:

- graudzāļu miltrasu (*Blumeria graminis*),
- pundurrūsu (*Puccinia hordei*),
- miežu lapu tīklplankumainību (*Pyrenophora teres*),
- miežu lapu brūnplankumainību (*Bipolaris sorokiniana*),
- stiebrzāļu gredzenplankumainību (*Rhynchosporium secalis*).

Deva: 0,75–1,5 l/ha. Apstrādāt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no miežu pirmā mezgla stadijas līdz karoglapas maksts atvēršanās stadijai (AS 31–49).

Auzu sējumos

Tango Super ir efektīvs pret:

- graudzāļu miltrasu (*Blumeria graminis*),

auzu vainagrūsu (*Puccinia coronata*).

Deva: 0,75–1,5 l/ha. Apstrādāt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no auzu otrā mezgla stadijas līdz karoglapas maksts atvēršanās stadijai (AS 32–49).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā visām kultūrām: 2 reizes.

Nogaidišanas laiks visām kultūrām: 35 dienas.

Tvertnes maisijumi: Tango Super var lietot maisijumos ar augšanas regulatoriem: Cycocel 750, Terpal vai Medax Top, herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdu Fastac 50 u.c. Nejaukt ar šķidriem minerālmēsliem, kuriem ir augsts slāpekļa saturs (vairāk par 3 kg/ha N), kā arī nesmidzināt šos maisijumus pie gaisa temperatūrām augstākām par 20°C!

Pirms lietošanas kannu labi sakratīt!

Ieteicamais darba šķiduma daudzums: 150–300 l/ha.

Bezlietus periods: 1 stunda.

Briesmas!

H332, H351, H360Df, H411, EUH401, P201, P261d, P281, P304+P340, P308+P313, P312, P391, P501, SP1, SPe3*