

## FUNGICĪDS

### Dithane\* NT

Pieskares iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai kartupeļu, sīpolu, ķiploku, puravu, burkānu, ziedkāpostu, brokoļu, ziemas kviešu, pupu, zirņu, ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, vīnogulāju, upeņu, jāņogu, ērkšķogu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kā arī dekoratīvo krūmu un kokaugu stādījumos un priežu un eglu skujbires ierobežošanai kokaudzētavās un jaunaudzēs.

**Preparatīvā forma:** disperģējošas granulas

**Darbīgā viela:** mankocebs 750 g/kg

**Reģistrācijas Nr. 0017**

**Reģistrācijas klase 2.**

**Neto saturs:** 10 x 1 kg, 6x300 g

**APSTIPRINU**  
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu  
reģistrācijas dajas vadītāja  
*R. Čudere*  
2019. 16. aprīlī *Ralf*



#### **Uzmanību**

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H400 Ľoti toksisks ūdens organismiem.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību.

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

P261 Izvairīties ieelpot putekļus/smīdinājumu

P280 Izmantot aizsargimndus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+ P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepiju un ūdens daudzumu

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediku palīdzību.

P337 +P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediku palīdzību.

P501 Atbrīvoties no saturā/ tvertnes ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/ neturīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

#### **Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšana.** Uzglabāt slēgtā oriģināla iepakojumā, vēsā un sausā vietā. Sargāt no uguns! Ja iepakojums tiek atvērts, to neuzglabāt līdz nākošajai sezonai.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

**Partijas numurs/izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma.

**Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:**

Indofil Industries Ltd.

Via Filippo Turati 6

20121 Milāna, Itālija

**Importētājs:**

Berner OY

Eteläranta 4, P.O. Box 15

FI-00131 Helsinki, Finland

**Berner/Indofil Industries Ltd. pārstāvniecība Latvijā:**

Graudu iela 58

LV – 1058, Rīga, Latvija

Tālr./Fakss: 67412073

\* - Indofil Industries Ltd.

*SANEMTS Nr. 285*

Viilsts augu aizsardzības dienesta  
Augu aizsardzības līdzekļu

reģistrācijas daja

20 15 g. "15." aprīlī

## FUNGICĪDS

### Dithane<sup>\*</sup> NT

Pieskares iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai kartupeļu, sīpolu, ķiploku, puravu, burkānu, ziedkāpostu, brokoļu, ziemas kviešu, pupu, zirņu, ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, vīnogulāju, upeņu, jāņogu, ērkšķogu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kā arī dekoratīvo krūmu un kokaugu stādījumos un priežu un eglu skujbires ierobežošanai kokaudzētavās un jaunaudzēs.

**Preparatīvā forma:** disperģējošas granulas

**Darbīgā viela:** mankocebs 750 g/kg

**Reģistrācijas Nr. 0017**

**Reģistrācijas klase 2.**

**Iepakojums:** 300 g, 1 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg



#### **Uzmanību**

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H400 Ľoti toksisks ūdens organismiem.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

P261 Izvairīties ieelpot putekļus/smidzinājumu

P280 Izmantot aizsargcīmdu/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediku palīdzību.

P337 +P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediku palīdzību.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/ netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm

**Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.**

**Uzglabāšana.** Uzglabāt slēgtā oriģināla iepakojumā, vēsā un sausā vietā. Sargāt no uguns! Ja iepakojums tiek atvērts, to neuzglabāt līdz nākošajai sezonai.

**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

**Partijas numurs/izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma.

**Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:**

Indofil Industries Ltd.

Via Filippo Turati 6

20121 Milāna, Itālija

**Importētājs:**

Berner OY

Eteläranta 4, P.O. Box 15

FI-00131 Helsinki, Finland

**Berner/Indofil Industries Ltd. pārstāvniecība Latvijā:**

Graudu iela 58

LV – 1058, Rīga, Latvija

Tālr./Fakss: 67412073

\* - Indofil Industries Ltd.

## **Pirmā medicīniskā palīdzība:**

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 min.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

## **Drošības prasības un personāla drošība**

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt darbojoties ar šo vielu. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtēpu, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgus cimdos un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

## **Preparāts un tā iedarbības veids**

**Dithane NT** satur darbīgo vielu mankocebs, kas bloķē 6 dažādus sēnu šūnu metabolisma procesus. Mankocebs saistās pie lapas virskārtas un iekļūs arī tās augšejos slāņos. Produkta iedarbības efektivitāti ietekmē meteoroloģiskie apstākļi, slimību izplatības intensitāte un kultūraugu augšanas ātrums apstrādes periodā. **Dithane NT** satur arī augu barības elementus: mangānu 150 g/kg un cinku 19 g/kg.

## **LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI**

Preparāta lietošana uzsākama profilaktiski pirms slimības pazīmju parādīšanās (pēc signāla!) vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm. **Dithane NT** ir pieskares iedarbības fungicīds un tādēļ ir nepieciešama augu virsmas rūpīga pārklāšana ar darba šķidrumu.

**Kartupeli.** Augu apsmidzināšana pret kartupeļu lakstu puvi (*Phytophthora infestans*) un kartupeļu lapu sausplankumainību (*Alternaria solani*) uzsākama profilaktiski pēc signāla par slimības parādīšanos vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, lietojot 2.0 kg/ha preparāta ar darba šķidruma patēriņu 200-600 l/ha un smidzinājumus atkārtojot ik pēc 7-10 dienām līdz 8 reizēm sezonā, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes. Pēc lietus vai laistišanas ļaut augiem nozūt un tikai tad veikt apstrādi ar **Dithane NT**. Nogaidīšanas laiks no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai ir 7 dienas.

**Šīpoli, ķiploki.** Pret šīpolu neīsto miltrasu (*Peronospora destructor*) un rūsu (*Puccinia allii*). Apstrādi uzsākt no kultūrauga 2 lapu stadijas ar minimālajiem intervāliem starp apstrādēm 7 dienas, lietojot 2.5 kg/ha preparāta ar darba šķidruma patēriņu 200-1000 l/ha līdz 4 reizēm sezonā. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 28 dienas. Neapstrādāt, audzējot segtajās platībās!

**Puravi.** Pret puravu neīsto miltrasu (*Phytophthora porri*) un rūsu (*Puccinia allii*). Apstrādi uzsākt no kultūrauga 2 lapu stadijas ar minimālajiem intervāliem starp apstrādēm 7 dienas, lietojot 2.5 kg/ha preparāta ar darba šķidruma patēriņu 200-1000 l/ha līdz 3 reizēm sezonā. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 60 dienas. Neapstrādāt, audzējot segtajās platībās!

**Burkāni.** Burkānu lapu sausplankumainības (*Alternaria dauci*) ierobežošanai burkānos. Apstrādi uzsākt no dīgstu stadijas ar minimālajiem intervāliem starp apstrādēm 14 dienas, lietojot 2.0 kg/ha preparāta ar darba šķidruma patēriņu 200-1000 l/ha līdz 4 reizēm sezonā. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 30 dienas.

**Ziedkāposti, brokoļi.** Neīstās miltrasa (*Peronospora parasitica*) ierobežošanai ziedkāpostos un brokoļos. Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos ar minimālajiem intervāliem starp apstrādēm 14 dienas, lietojot 2.0 kg/ha preparāta ar darba šķidruma patēriņu 200-1000 l/ha līdz 4 reizēm sezonā. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 30 dienas. Neapstrādāt, audzējot segtajās platībās.

**Ziemas kvieši.** Kviešu lapu pelēkplankumainības (*Septoria tritici*) un vājas līdz vidējas infekcijas pakāpes brūnās rūsas (*Puccinia recondita*) ierobežošanai. Pret kviešu lapu pelēkplankumainību veikt divas apstrādes ar 14 dienu intervālu, sākot ar kviešu stiebrošanas stadiju (AS 31-37). Apstrādi veikt

pirms slimība ir plaši izplatījusies. Pret rūsām veikt vienu vai divas apstrādes slimības parādīšanās sākumā. Deva 2.0 kg/ha ar darba šķidruma patēriņu 200-400 l/ha. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 60 dienas.

**Pupas, zirņi.** Neīstās miltrasas (*Peronospora viciae*; *Phytophthora phaseoli*) un rūsas (*Uromyces appendiculatus*) ierobežošanai. Apstrādi veikt no kultūrauga 3 lapu stadijas līdz 50 % no pākstīm ir sasniegušas pilno garumu, lietojot 2.0 kg/ha preparāta ar darba šķidruma patēriņu 200-400 l/ha vienu reizi sezonā. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 28 dienas.

**Ābeles, bumbieres.** Pret ābeļu kraupi (*Venturia inaequalis*) un bumbieru kraupi (*Venturia pirina*). Apsmidzināt profilaktiski pēc brīdinājuma par asku sporu izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem, sākot ar kultūrauga pumpuru piebriešanas stadiju līdz kraupja sporu izplatīšanās beigām. **Dithane NT** nodrošina 7 dienu aizsardzību pret ābeļu kraupi. Nogaidīšanas periods līdz nākamajai apstrādei ar **Dithane NT** ir 14 dienas. Rekomendējam lietot kādu citu aizsargājošu fungicīdu pārmaiņus ar **Dithane NT** ik pēc 7 dienām. **Dithane NT** var tikt lietots tvertnes maisījumā ar kādu citu fungicīdu. Deva 2.0 kg/ha ar darba šķidruma patēriņu 400-1500 l/ha līdz 4 reizēm sezonā, ieskatot apstrādes pret bumbieru- kadiķu rūsu. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 28 dienas.

**Plūmes ķirši.** Pret plūmju rūsu (*Tranzschelia discolor*), kauleņkoku sausplankumainību (*Stigmina carpophila*) un vējplūmēm (*Taphrina pruni*) apstrādi ar **Dithane NT** veikt, kad pirmās lapas ir pilnīgi izplaukušas. Minimālais nogaidīšanas periods līdz nākamajai apstrādei ar **Dithane NT** ir 14 dienas. Deva 2.0 kg/ha ar darba šķidruma patēriņu 400-1500 l/ha līdz 4 reizēm sezonā. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 30 dienas.

**Vīnogas.** Neīstās miltrasas (*Plasmopara viticola*) ierobežošanai. Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos ar minimālajiem intervāliem starp apstrādēm 14 dienas, lietojot 2.0 kg/ha preparāta ar darba šķidruma patēriņu 400-1500 l/ha līdz 4 reizēm sezonā. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 56 dienas.

**Upenes, jāņogas, ērkšķegas.** Oguļaju lapu iedegu (*Pseudopeziza ribis*) ierobežošanai. Pirmā apstrāde būtu jāveic uzreiz pēc ziedēšanas (upenēm un jāņogām) vai ziedēšanas sākumā (ērkšķogām), minimālie intervāli starp apstrādēm – 10 dienas. Ja slimības izplatība ir intensīva, **Dithane NT** var lietot arī pēc ražas novākšanas. Deva 2.0 kg/ha ar darba šķidruma patēriņu 400-1000 l/ha līdz 4 reizēm sezonā. Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas - 30 dienas.

### Krāšņumaugi

**Dithane NT** var tikt lietots gan pavasarī, gan vasarā ziedošiem krāšņumaugiem, lai nodrošinātu dažādu krāšņumaugu slimību ierobežošanu. **Dithane NT** nedrīkst lietot krāšņumaugos, audzējot tos segtajās platībās.

**Šīpolpuķes** - pavasarī un vasarā ziedošas sugas, tai skaitā hiacintes, tulpes, krokusi, narcises, gladiolas, īrisi, lilijas. Lieto pret pelēko puvi (*Botrytis cinerea*). Smidzināšanu veikt profilaktiski, kad augi ir 1-2.5 cm gari un atkārtot ar 7 dienu intervālu. Vienmēr veikt divas apstrādes pēc ziedēšanas. Deva 2.0 kg/ha ar darba šķidruma patēriņu 200-1000 l/ha līdz 4 reizēm sezonā.

**Pelargonijas, nelkes, ģerānijas, magones u.c. krāšņumaugi.** Lieto pret neīstajām miltrasām (*Peronospora spp.*) un rūsām (*Puccinia spp.*). Apstrādi veikt profilaktiski vai parādoties slimību pirmajām pazīmēm ar 7-10 dienu intervāliem starp apstrādēm, lietojot 2.0 kg/ha preparāta ar darba šķidruma patēriņu 200-1000 l/ha līdz 4 reizēm sezonā.

**Rozes.** Lieto pret rožu lapu tumšplankumainību (*Diplocarpon rosae*) un rožu rūsu (*Phragmidium mucronatum*). Apstrādi uzsākt tiklīdz parādās pirmie slimību simptomi un atkārtot, ja nepieciešams, ar 10-14 dienu intervāliem. Deva 2.0 kg/ha ar darba šķidruma patēriņu 200-1000 l/ha līdz 4 reizēm sezonā.

**Dekoratīvie krūmi un kokaugi.** Lieto neīsto miltrasu (*Peronospora spp.*) un rūsu (*Puccinia spp.*, *Uromyces spp.*) ierobežošanai. Apstrādi veic profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Deva 2.0 kg/ha, darba šķidruma patēriņš 400-1500 l/ha, maksimālais apstrāžu skaits – 4, minimālais intervāls starp smidzinājumiem – 14 dienas.

**Priedes un egles kokaudzētavās un jaunaudzēs.** Lieto priežu skujbires (*Lophodermium pinastri*) un egļu skujbires (*Lophodermium macrosporum*) ierobežošanai. Apstrādi veic profilaktiski īsi pirms slimības ierosinātāja izplatības sākuma. Atkārtota apstrāde pēc 7-14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības ierosinātāja izplatības intensitātes. Deva 2.0 kg/ha ar darba šķidruma patēriņu 200-1000 l/ha līdz 4 reizēm sezonā.

#### **Mazais lietojums.**

Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 51. punktu.

Bumbieru-kadiķu rūsas (*Gymnosporangium fuscum*) ierobežošanai apsmidzināt bumbieres pumpuru plaukšanas laikā un atkārtoti pēc 14 dienām līdz primārās infekcijas uzliesmojuma beigām. Profilaktiska **Dithane NT** lietošana no lapu plaukšanas brīža līdz jūnija sākumam, lai cīnītos pret bumbieru kraupi (*Venturia pirina*), vienlaicīgi novērš arī bumbieru-kadiķu rūsas parādīšanos.

Deva: 2.0 kg/ha.

Darba šķidruma patēriņš 400-1500 l/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā līdz 4 reizēm, ieskaitot apstrādes pret bumbieru kraupi.

Nogaidīšanas laiks pirms ražas novākšanas -28 dienas.

**Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

#### **LIETUS NOTURĪBA**

Nepieciešams bezlietus periods pēc **Dithane NT** lietošanas ir 1-2 stundas.

#### **DARBA ŠĶIDRUMA PAGATAVOŠANA**

**Dithane NT** vispirms jāsajauc ar nelielu ūdens daudzumu, tad pie ieslēgta maisītāja jālej smidzinātāja tvertnē ar ūdeni. Gatavu darba šķidrumu nedrīkst atstāt nākošai dienai. Pēc darba smidzinātājs rūpīgi jāizmazgā ar ūdeni, jāiztīra sprauslas. Mazgājamo ūdeni var izmantot **Dithane NT** darba šķidruma pagatavošanai nākamajā dienā vai tas izsmidzināms uz apstrādātā lauka.

#### **LAIKA APSTĀKLIS**

**Dithane NT** ir lietojams sausos kultūraugos, nelietot uzreiz pēc lietus vai laistīšanas. Labāk smidzināšanu veikt no rīta vai vakarā. Nelietot, kad gaisa temperatūra pārsniedz +25 °C un kad relatīvais mitrums ir zem 30 %.

#### **SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (SAVIENOJAMĪBA)**

**Dithane NT** jaucams ar visiem Latvijā reģistrētajiem insekticīdiem, fungicīdiem un akaricīdiem. Veidojot tvertnes maisījumus ar citiem produktiem, pievienojiet **Dithane NT** pēc tam, kad pārējie tvertnes maisījuma komponenti ir izšķuduši smidzinātāja tvertnē. Nedrīkst jaukt ar eļļu saturošiem un sarmainiem preparātiem (piem., Bordo šķidumu). Neskaidribu gadījumā kontaktēties ar firmas pārstāvji Latvijā.

#### **PRETREZISTENCES STRATĒGIJA**

Atkārtota tādu augu aizsardzības līdzekļu lietošana, kuriem ir tikai viens iedarbības veids, var radīt rezistentu slimības izraisošo patogēnu izveidošanos. Lai novērstu vai aizkavētu rezistentu patogēnu izveidošanos, ieteicams lietot fungicīdus programmās, kurās ietilpst produkti ar dažādu iedarbības mehānismu.

**Dithane NT** ir fungicīds, kuram ir vairāki iedarbības veidi, līdz ar to tas ļoti labi der pret-rezistences stratēģiju programmās.

Svarīgi ir ievērot augmaiņu. Agronomiski nepamatota augmaiņa visbiežāk var izraisīt intensīvu slimību izplatību.

#### **SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA**

Lai novērstu nākošo apstrādājamo kultūraugu, izņemot graudaugus, iespējamos bojājumus, smidzināšanas iekārta pēc lietošanas ir rūpīgi jānomazgā gan no iekšpuses, gan ārpuses, lietojot speciālo mazgāšanas līdzekli All Clear™ Extra.

1. Iztukšojet smidzinātāju uz lauka pilnībā. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām nomazgājiet to no ārpuses.

2. Izskalojiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni un iztukšojet to, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka. Iztukšojet smidzinātāju pilnībā.
  3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz pusei un pievienojiet rekomendēto daudzumu All Clear™ Extra. Samaisiet un izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām. Piepildiet tvertni pilnu ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju uz 15 minūtēm. Iztukšojet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojet smidzinātāju pilnībā.
  4. Sprauslas un filtri jānoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear™ Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens.
  5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni. Iztukšojet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojet smidzinātāju pilnībā.
  6. Mazgāšanas un skalošanas ūdeņi jānovirza vietās, kur tie nevar nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un nevar nonākt gruntsūdeņos vai virszemes ūdens tilpnēs. Neizsmidzināt uz jutīgiem kultūraugiem vai tīr umos, kur tos paredzēts audzēt.
- Piezīme:** Ja tvertni nav iespējams iztukšot pilnībā, 3. punktā minētās darbība ir jāatkārto, pirms veic 4. punktā minētos pasākumus

### **VIDES AIZSARDZĪBA**

Ļoti toksisks ūdens organismiem. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo koka augu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

### **UZGLABĀŠANA**

Dithane NT jāuzglabā slēgtā oriģināla iepakojumā, vēsā un sausā vietā. Sargāt no uguns! Ja iepakojums tiek atvērts, to neuzglabāt līdz nākošajai sezonai.

### **DERĪGUMA TERMINŠ**

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

### **TUKŠĀ TARA**

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

### **JURIDISKĀ ATBILDĪBA**

Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, taču tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai piemērotību jebkādai tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās produktu lietošanā.

#### **Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:**

Indofil Industries Ltd.  
Via Filippo Turati 6  
20121 Milāna, Itālija

#### **Importētājs:**

Berner OY  
Etelärantta 4, P.O. Box 15  
FI-00131 Helsinki, Finland

#### **Berner/Indofil Industries Ltd. pārstāvniecība Latvijā:**

Graudu iela 58  
LV – 1058, Rīga, Latvija  
Tālr./Fakss: 67412073

#### **Tirdzniecības preču zīmes reģistrētas:**

Dithane\* NT – Indofil Industries Ltd.  
All Clear™ Extra - E.I. du Pont de Nemours Co