

Penncozeb 75 DG

Fungicīds

Pieskares iedarbības fungicīds kartupeļu lakstu puves (*Phytophthora infestans*) un kartupeļu lapu sauspilankumainības (*Alternaria solani*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Darbīgā viela: 75 % mankocebs

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Reģistrācijas numurs: 0273

Reģistrācijas klase: 2.

APSTIPRINU
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļas vadītāja
R.Čūdere
2016. g. 16. "maī"



SAŅEMTS Nr. 229
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības līdzekļu
reģistrācijas daļā
2016. g. 16. "maī"

Uzmanību

- H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P308+P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīnu palīdzību.
P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicīnu palīdzību.
P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt lietošanas iekārtas ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
Spe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons, 112

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

Partijas numurs: skatīt uz iepakojuma

Iepakojums: 10 KG

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā, labi vēdināmā un vēsā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Stingri jā- ievēro, lai preparāts uzglabāšanas laikā netiktu samitrināts un nepārkarstu. Pārkaršana var izraisīt ķīmiskas pārvērtības, kas negatīvi ietekmē fungicīda iedarbību un var izraisīt aizdegšanos.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Pirmā palīdzība.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, to nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Neizsaukt vemšanu. Griezties pēc palīdzības pie ārsta. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā nelaiemes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Norādījumi ārstam.

Antidots nav zināms. Simptomātiska ārstēšana.

Saīndēšanās informācijas centra tālruna numurs 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība.

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt darbojoties ar vielu. Augu aizsardzības līdzekli uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi vides aizsardzības, darba drošības un personīgās higiēnas noteikumi. Preparāts kairina elpošanas orgānus. Jāuzmanās, lai augu aizsardzības līdzeklis vai darba šķidrums nenokļūtu uz ādas un acīs.

Sagatavojot darba šķidrumu un strādājot, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps ar galvas segu, aizsargbrilles, aizsargmaska, gumijas cimdi un gumijas zābaki. Darba laikā aizliegts ēst, dzert un smēķēt. Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Sakarā ar iespējamo šoka efektu divas nedēļas pēc saīndēšanas lietot alkoholu stingri aizliegts.

Preparāta raksturojums.

Penncozeb 75 DG ir pieskares iedarbības fungicīds, kas izveido plānu aizsargkārtiņu uz auga virsmas un traucē sporu dīgšanu, tādēļ ir nepieciešama augu virsmas rūpīga pārklāšana ar darba šķidrumu.

Lietošana.

Penncozeb 75 DG lietošana uzsākama profi laktiski pirms slimību pazīmju parādīšanās (pēc signāla!) vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem.

Ūdens patēriņš 200 - 400 l/ha

Apstrādājam ākultūra	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha, kg/t vai %	Ieteicamā darba šķidruma konc, %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Kartupeļi	Kartupeļu lakstu puve (Phytophthora infestans), kartupeļu lapu sausplankumainība (Alternaria solani)	2.0		Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 7-14 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības attīstības intensitātes.	7	8

Darba šķidruma sagatavošana.

Jāpārbauda smidzinātāja bākas tīrība. Izvēlieties pareiza tipa sprauslas. Ar mērtrauka palīdzību pārbaudiet vai visas sprauslas izsmidzina vienādu ūdens daudzumu un vai tās pareizi uzstādītas. Nosakiet darba šķidruma patēriņu uz hektāra (laukuma vienību). Tad jāsamaisa nepieciešamais preparāta daudzums traukā ar ūdeni, iegūstot suspensiju. Smidzinātāja bāku līdz pusei uzpilda ar ūdeni un, nepārtraukti maisot, caur filtru pievieno sagatavotā preparāta suspensiju. Atlikušais ūdens daudzums jāpievieno nepārtraucot maisīšanu. Jānodrošina darba šķidruma maisīšana apstrādes laikā. Katru reizi pēc darba beigām smidzinātājs rūpīgi jāizmazgā ar tīru ūdeni.

Darba šķidrumu muguras smidzinātājā sagatavo šādi:

10 l ūdens pievieno 50 g iepriekš mazākā ūdens daudzumā izšķīdināta preparāta un samaisa, ar sagatavoto darba šķidrumu apsmidzina ne mazāk kā 250 m² lielu platību.

Darba šķidruma maisījumi.

Penncozeb 75 DG ir savienojams ar insekticīdiem, fungicīdiem un akaricīdiem. Nedrīkst jaukt ar eļļu saturošiem un sārmainiem preparātiem (Bordo šķidrums).

Iepakojuma likvidēšana.

Pēc preparāta izmantošanas tukšo taru likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Tukšo taru izmantot atkārtoti aizliegts.

Vides aizsardzības prasības.

Ļoti toksisks ūdens organismiem. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.

Netīrīt lietošanas iekārtas ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā.

Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas. Noplūdes gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālās vides pārvaldei.

Uzglabāšana.

Preparātu uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā sausā, labi vēdināmā un vēsā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Stingri jāievēro, lai preparāts uzglabāšanas laikā netiktu samitrināts un nepārkarstu, jo pārkāršana var izraisīt ķīmiskas pārvērtības, kas negatīvi ietekmē fungicīda iedarbību un arī var izraisīt aizdegšanos.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība.

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs nosaukums un adrese:

UPL Europe Ltd
The Centre, Birchwood Park,
Warrington, Cheshire WA3 6YN, UK.
Tel: +44 (0)1925 859000
Fax: +44 (0)1925 817425

Izplatītāja nosaukums un adrese:

AGRIMATCO LATVIA SIA
Tīraies iela 5c
Rīga, LV 1058
Tel. 67807711
Fakss 67672217
e-pasts: agrimatco.latvia@agrimatco-eu.com