

Corum[®]

Herbicīds



LIETOŠANAS ABC



VIENA APSTRĀDE

- AS 14-15:
Corum[®] + Dash[®]
1,0-1,25 l/ha + 1,0 -1,25 l/ha



SITUĀCIJĀ, JA:

- Ir pietiekams mitruma nodrošinājums pirms un pēc sējas.
- Zems līdz vidējs nezāļu piesārņojums.



DALĪTĀ APSTRĀDE

- AS 12-13:
Corum[®] + Dash[®]
0,625 l/ha + 0,625 l/ha
- AS 14-15:
Corum[®] + Dash[®]
0,625 l/ha + 0,625 l/ha



SITUĀCIJĀ, JA:

- Ilgstošs sausums, nezāles dīgst ilgā laika periodā.
- Liels piesārņojums ar nezālēm, īpaši akļiem, vējgriķi, matuzāli, gerānijām, ķeraiņu madaru.
- Kūdrainas augsnes (piesārņotas, piem., ar akļiem).
- Nezāles, kurām ir lielas sēklas, kas var dīgt no lielāka dziļuma vēlāk.



DIVAS APSTRĀDES

- Pirms sadīgšanas:
Stomp[®] 1.5 l/ha
- AS 14-15:
Corum[®] + Dash[®]
1,0 l/ha + 1,0 l/ha



SITUĀCIJĀ, JA:

- Liels piesārņojums ar vijolīti, veronikām, maura skareni, vējgriķi.



Vislabākos rezultātus sasniegsiet, ja nezāles apstrādes brīdī būs mazas – 1-2 lapu stadijā.


Lietojiet augu aizsardzības līdzekļus atbilstīgi drošības prasībām.
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

BASF

We create chemistry

Corum® dalītā apstrādē ļauj iegūt augstākas ražas sausos gados

Papildus iegūtā raža, t/ha



Dotnuva, 2020. gads, lauka pupas 'Vertigo'

Corum® – apstrādes stratēģija piemērojama atkarībā no nezāļu spektra

Efektivitāte, %

Nezāļu suga	Nezāļu skaits kontrolē	Corum® 1,25 l/ha + Dash® 0,5 l/ha AS11-13	Corum® 0,625 l/ha + Dash® 0,5 l/ha lietojot 2x: AS11-13 un AS14-15	Corum® 1,25 l/ha + Dash® 1,0 l/ha AS14-15	Stomp® 1,5 l/ha pirms sadīgšanas, Corum® 1,0 l/ha + Dash® 0,5 l/ha AS14-15
		Baltā balanda	27,5	93	97,5
Sārtā panātre	17,5	72	97,8	98	98,5
Tīrumu veronika	16,8	65	88,5	92,3	99
Dārzu vējgriķis	18,8	65	91,5	90	96,6
Ķeraiņu madara	12,2	70,8	97,5	98	97
Lauku vijolīte	7	54	57	70	83,3

Apstrāde bijusi par ātru

Dalītā apstrāde

Apstrāde bijusi pareizā laikā

Divu apstrāžu stratēģija (pirms un pēc sadīgšanas) bijusi labākā izvēle

Dotnuva, 2019. gads, zirņi 'Respect', nezāļu uzskaitē 28. jūnijā (28 dienas pēc pēdējās apstrādes)



IEGŪSTIET LABĀKO REZULTĀTU OPTIMĀLOS LAIKA APSTĀKĻOS!

Optimālās temperatūras apstrādei ar Corum® – virs + 5° C naktī un virs + 10° C dienā. Tas nodrošinās, ka nezāles būs aktīvi augošas un herbicīda iedarbība būs labāka.

- Neveikt apstrādi, ja temperatūras naktī ir zem + 3° C! Pēc salnām nogaidīt 2-3 dienas.
- Apstrāde rīta pusē nodrošinās labākus apstākļus darbīgo vielu iekļūšanai augā.

BASF

We create chemistry