

# Butisan® 400

Herbicīds īsmūža divdīglīlapju un dažu īsmūža viendīglīlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša, ripša, sinepju, ziedkāpostu, galviņkāpostu, lopbarības kāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, Ķinas kāpostu un Pekinas kāpostu sējumos un stādījumos

Reģistrācijas Nr.	0037
Reģistrācijas klase:	2.
Darbīgā viela:	metazahlors 400 g/l
Formulācija:	suspensijas koncentrāts
Iepakojums:	5 l; 10 l

## Preparāta apraksts

Butisan 400 nezāles uzņem caur saknū sistēmu un dīgstiem. Ja herbicīdu izsmidzina uz augsnēs pirms nezāļu dīgšanas, tas ieklūst augos caur saknēm dīgšanas laikā un ūsi pēc sadīgšanas nezāles aiziet bojā. Ja herbicīds tiek lietots pēc nezāļu sadīgšanas, tas ieklūst augā gan caur saknēm, gan lapām.

Butisan 400 efektivitātes un vienmērīgas rapša dīgšanas nodrošināšanai nepieciešams rūpīgi sagatavot augsti sējai, izveidojot kvalitatīvu sēklas gultni, tādējādi nodrošinot vienmērīgu sējas dzījumu visā laukā (1,5–2,5 cm).

Pietiekams augsnēs mitrums nodrošina preparāta nokļūšanu līdz nezāļu saknēm, līdz ar to arī augstu

efektivitāti. Žoti sausas augsnes apstākļos, kad rapša dīgšana ir apgrūtināta, ieteicams apstrādi ar Butisan 400 veikt tikai pēc rapša sadīgšanas. Ja Butisan 400 izsmidzināts uz lauka, kad augsnēs virskārta ir sausa, preparāts efektīvi sāk darboties tikai pēc pirmajiem nokrišņiem.

Herbicīda darbību ietekmē arī augsnēs tips un struktūra. Pietiekamam Butisan 400 efektam nepieciešama labi sastrādāta, sīkdrupataina augsne, bez lielām cilām. Augsnēs ar ūti augstu organiskās vielas saturu, slikti sastrādātās augsnēs vai ūti sausos laikapstākļos herbicīda efektivitāte samazinās. Nav ieteicama Butisan 400 lietošana vieglās, ūti smilšainās augsnēs.

**Efektivitāte,** apstrādājot ar devu 1,875 l/ha pirms rapša sadīgšanas**Ļoti jutīgas nezāles** (efektivitāte > 95%)

Nesmaržīgā suņķumelīte	Parastā virza	Tīruma veronika
Sārtā panātre	Tīruma neaizmirstuļīte	Atliektais amarants
Parastā rūdzusmilga	Vējgrīķis	Nakts plaukšķene
Skarenes		

**Jutīgas nezāles** (efektivitāte 85–94%)

Garu plikstiņš	Lauka magone	Smaržīgā kumelīte
Tīruma radzene	Persijas veronika	

**Vidēji jutīgas nezāles** (efektivitāte 70–84%)

Baltā balanda	Tīruma naudulis	Keraļu madara
---------------	-----------------	---------------

**Vāji jutīgas nezāles** (efektivitāte 50–69%)

Tīruma vijolīte	Saules dievkrēslīņš	Kvieši sārnīaugi
-----------------	---------------------	------------------

**Efektivitāte,** apstrādājot ar devu 1,875 l/ha pēc rapša sadīgšanas**Ļoti jutīgas nezāles** (efektivitāte > 95%)

Vējgrīķis	Tīruma veronika	Mīkstā gandrene
Skarenes		

**Jutīgas nezāles** (efektivitāte 85–94%)

Parastā rūdzusmilga	Persijas veronika	Smaržīgā kumelīte
---------------------	-------------------	-------------------

**Vidēji jutīgas nezāles** (efektivitāte 70–84%)

Nesmaržīgā suņķumelīte	Keraļu madara	Sārtā panātre
Skaujošā panātre	Parastā virza	

**Vāji jutīgas nezāles** (efektivitāte 50–69%)

Baltā balanda	Tīruma radzene
---------------	----------------

**Lietošana**

Optimālais apstrādes laiks ar Butisan 400 ir uzreiz pēc sējas, pirms rapša sadīgšanas.

Butisan 400 efektivitāte ir atkarīga no augsnēs mitruma, tādēļ sausos laikapstākļos apstrādi ar Butisan 400 ieteicams veikt agri no rīta, kamēr ir rasa.

## Ziemas rapša sējumos

**Deva: 1,875 l/ha** Butisan 400. Apstrādi ieteicams veikt nezāļu dīgšanas laikā vai ne vēlāk kā to dīgllapu stadijā. Pēc dīgllapu stadijas, līdz 1. īsto lapu stadijai veiksniņi var ierobežot tikai tās nezāles, kuras ir ļoti jutīgas pret Butisan 400, piemēram, kumelītes, panātres un veronikas. Pret citām nezālēm šajā laikā Butisan 400 efektivitāte strauji krītas.

## Vasaras rapša sējumos

**Deva: 1,875 l/ha** Butisan 400. Apstrādi veikt uzreiz pēc sējas, bet ne vēlāk kā nezāļu dīgllapu stadijā. Ja pavasař pēc Butisan 400 lietošanas iestājas sausuma periods, pēc pirmajiem nokrišņiem herbicīds savu darbību atjauno.

## Galvīnkāpostu, ziedkāpostu, lopbarības kāpostu platībās

**Deva: 1,875 l/ha** Butisan 400. Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas vai stādījumus 8–10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas, līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS16).

## Mazais lietojums

Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2011 51. pantu.

## Kīnas kāpostu, Pekinas kāpostu platībās

**Deva: 1,875 l/ha** Butisan 400. Apsmidzināt stādījumus 8–10 dienas pēc kultūrauga izstādīšanas, līdz kultūrauga 6 lapu stadijai (AS 16).

**Maksimālais apstrāžu skaits sezonā:** 1 reize.

**Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

**Piezīmes:** Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru vairāk nekā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā 3 gadu periodā.

Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus – gan izdīgušus, gan neizdīgušus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

**Ievērībai!** Pēc apstrādes ar Butisan 400 nav ieteicams veikt augsnes pievelšanu vai citus augsnes apstrādes darbus. Tas samazina preparāta iedarbības efektivitāti un var negatīvi ietekmēt kultūraugus. Stipras lietusgāzes tūlīt pēc apstrādes var ieskalot herbicīdu augsnē, kaitējot arī kultūraugam.

Nav ieteicams smidzināt sējumu, ja augi ir cietuši no salnām, vai arī salnas ir gaidāmas, kā arī, ja lapu virsma ir mitra vai karstā laikā.

Platiābās, kur rapsis tiek sēts ar tiešās sējas paņēmienu pēc graudaugiem rugainē, ir iespējama Butisan 400 efektivitātes samazināšanās, jo šajās platiābās augsti nosedz vecās nezāles, salmi un citas organiskās atliekas no iepriekšējās ražas kultūraugiem.

**Pēcietekme:** Ja ziemas rapsis aizgājis bojā rudenī, pēc aršanas 20 cm dzīlumā, var sēt kviešus vai miežus. Ja ziemas rapsis nav pārziemojis laukā, kur rudenī smidzināts Butisan 400, pavasarī pēc kultivēšanas (apmēram 20 cm dzīlumā) var sēt vasaras rapsi, citus krustziežus, graudaugus, lauka pupas, zirņus, kukurūzu, linus, cukurbietes un stādīt kartupeļus. Ja ar Butisan 400 apstrādāts vasaras rapsis ir aizgājis bojā, iespējams audzēt citus krustziežus vai kartupeļus. Vieglās augsnēs nav ieteicams pārsēt graudaugus. Pēc rapša ražas novākšanas var tikt audzēta jebkura kultūra.

**Tvertnes maisījumi:** Butisan 400 var lietot tvertnes maisījumos ar insekticīdu Fastac 50.

Ja sakrīt optimālie lietošanas termini, Butisan 400 var lietot tvertnes maisījumā ar graminicīdu Focus Ultra, nepievienojot virsmas aktīvo vielu Dash!

**Pirms lietošanas kannu labi sakratīt!**

**Ieteicamais darba šķīduma daudzums:** 200–400 l/ha.

---

Uzmanību!

H302, H351, EUH208, H410, EUH401, P201, P280, P301+P312, P308+P313, P391, P501, SP1, SPe1, Spe3, SPe3\*