

tradebor® Mo



Darbīgā viela: boretanolamīns, molibdēns

Forma: šķīdums

Klasifikācija: EK mēslojums

Krāsa: brūna

1 proc. šķīduma pH līmenis: 7,5

1 proc. šķīduma blīvums: 1,4 g/cm³

IĒPAKOJUMS

20 l

BORA UN MOLIBDĒNA LAPU MĒSLOJUMS ETANOLAMĪNA FORMĀ.

ĶĪMISKAIS SASTĀVS

	saturs, %	tilpums, %	g/l
Bora etanolamīns (B), ūdenī šķīstošs	8,1	10,5	105,0
Molibdēns (Mo), ūdenī šķīstošs	0,9	1,2	12,0

APRAKSTS

Tradebor Mo ir koncentrēts bora un molibdēna lapu mēslojums boretanolamīna formā, šķīduma koncentrāts.

Bors etanolamīna formā ir ūdenī ātri šķīstošs un augiem viegli uzņemams. Mēslojums ātri iekļūst augā un pakāpeniski izmantojas, radot dabisku zaļēšanas efektu.

Boram un molibdēnam ir būtiska loma augu vielmaiņas procesos, tas nodrošina ziedu veidošanos, putekšņu auglību, augļu stingrību un ūdens transpirāciju augā.

Tradebor Mo ieteicams lietot boru prasīgiem kultūraugiem (rapsim, pupām, zirņiem, kāpostiem, dārzeņiem) profilaktiski vai visiem kultūraugiem, lai ātri un efektīvi novērstu bora trūkumu.

Tvertnes maisījuma sagatavošana: pirms lietošanas sakratīt. Savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažādiem mēslošanas līdzekļiem. Iepildiet 2/3 no nepieciešamā ūdens daudzuma, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet *Tradebor*. Pievienojiet citus mēslošanas līdzekļus vai augu aizsardzības līdzekļus un atlikušo ūdens daudzumu. Darba šķidrums uzreiz izlietojiet. Ilgi maisīts darba šķidrums var homogenizēties. Maisījumā nav vēlams jaukt vairāk par diviem komponentiem. Nejaukt ar *Tradecorp AZ*. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI		
KULTŪRAUGI	DEVA	LIETOŠANA
Smidzināšanai uz lapām		
Rapsis	1,0 l/ha	lieto rudenī pirms ziemas iestāšanās;
	2,5 l/ha	lieto pavasarī, atsākoties veģetācijai, no rozetes attīstības stadijas līdz ziedkopas attīstīšanās stadijai;
Zirņi, pupas	2,5 l/ha	lieto, kad augi sasnieguši 10-15 cm augumu, līdz ziedpumpuru veidošanās stadijai;
Lucerna	5,0 l/ha	lieto ziedkopas veidošanās stadijā un pirms ziedēšanas;
Kartupeļi, dārzeņi	3,0-5,0 l/ha	lieto, līdzko izveidojusies pietiekama lapu virsma;
Kāposti, ziedkāposti	5,0 l/ha	lieto 2 reizes. Pirmo smidzināšanu veic 2 nedēļas pēc pārstādīšanas, smidzināšanu atkārti pēc 10-15 dienām;
Augļu koki, ogulāji	3,0 l/ha	lieto pirms pumpuru veidošanās stadijas;
	1,0 l/ha	pirms augļu veidošanās stadijas.

Piezīme: Minimālais darba šķidruma daudzums – 200 l/ha. Nesmidzināt, ja gaidāmas salnas un ziedēšanas laikā.

TRADEBOR MO IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:

- bora un molibdēna prasīgo kultūraugu papildmēslošanai (rapsis, zirņi, pupas, kartupeļi, sakņu dārzeņi un kāpostaugi);
- lai ar vienu smidzināšanu nodrošinātu nepieciešamo bora un molibdēna daudzumu – ekonomisks risinājums;
- bagātīgai augu ziedēšanai un ziedputekšņu produktivitātei;
- rapša ražas kvantitātei (vairāk pākšu, tajās vairāk sēklu);
- ja izteikti skābas vai pārlietu sārmainas augsnes;
- ja izteikti vieglas un smilšainas augsnes;
- ja ilgstošs sausums;
- lai stimulētu fizioloģiskos procesus augā un palielinātu to ražīgumu;
- lai stiprinātu ziemas rapšu ziemotspēju.