

tradebor[®] Mo

Mēslojuma koncentrāts ar bora etanolamīnu un molibdenu



EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

Garantētais sastāvs:

	Saturs%	Tilpums%	g/l
Bors (B) etanolamīna formā ūdenī šķīstošs	8,1	10,5	105
Molibdens (Mo) ūdenī šķīstošs	0,9	1,2	12

LV04/2V02/0315

Importētājs un pārdevējs

SIA Baltic Agro
Lielirbes 32a,
Rīga, Latvija
Tālr. 371-67228851
www.balticagro.lv

NETO MASA
20 L (26 Kg)



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



APRAKSTS

Tradebor ir bora (B) un molibdēna (Mo) mēslojums augu papildmēslošanai caur lapām. Mēslojumu ieteicams lietot bora prasīgiem kultūraugiem profilaktiski vai visiem kultūraugiem, lai novēstu bora un molibdēna trūkumu. Mēslojumā bors ir bora-etanolamīna formā, kas ir augiem caur lapām viegli uzņemams. Mēslošanas līdzekli ieteicams lietot krustziežu un tauriņziežu dzimtas augiem.

LIETOŠANA

Mēslošanai caur lapām

Augļu koki:	3 l/ha pirms ziedēšanas. 1 l/ha birstot ziedlapiņām vai augļu aizmešanās attīstības sākuma stadijā.
Lucerna:	5 l/ha rozetes attīstības stadijā un pirms ziedēšanas.
Kartupeļi, dārzeņi:	3-5 l/ha smidzinājumu veicot līdzko pietiekama lapu virsma.
Zirņi, pupas:	2,5 l/ha kad augi 10-15 cm garī un ziedpumpuru attīstības sākuma stadijā
Kāposti, ziedkāposti:	5 l/ha, smidzinājumu atkārtojot 2-3 reizes, pirmo smidzinājumu veicot 2 nedēļas pēc izstādīšanas, otro smidzinājumu atkārtojot pēc 10-15 dienām un trešo smidzinājumu, kad sāk veidoties galviņas.
Rapši:	1 l/ha pirms ziemas iestāšanās rozetes attīstības stadijā. 1,5 l/ha smidzinājumu veicot 2-3 reizes sezonā, ja nelabvēlīgi augšanas apstākļi. 1-2 l/ha ziemas rapsim, smidzinājumu veicot vienu reizi rudenī rozetes attīstības stadijā un otro reizi pavasarī ziedpumpuru attīstības sākuma stadijā.
Gurķi:	3 l/ha smidzinājumu atkārtojot 3 reizes pirms pirmo ziedu parādīšanās, sadalot uz 2-3 smidzināšanas reizēm sezonā.
Tomāti:	3-5 l/ha smidzinājumu atkārtojot 3 reizes pirms pirmo ziedu parādīšanās, sadalot uz 2-3 smidzināšanas reizēm sezonā.

Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 150-400 l/ha.

Temperatūra ne zemāka par +5°C.

SADERĪBA

Tradebor Mo ir saderīgs ar lielāko daļu mēslošanas līdzekļu un agroķīmijas produktu, kurus parasti izmanto. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu. Maksimālā efekta sasniegšanai, smidzinājumu veikt pa auga sausām lapām. Maksimālu produkta efektivitāti garantēs 3-4 stundu ilga bezlietus perioda ievērošana.

BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE

Sakrata pirms lietošanas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Pirms lietošanas izlasīt marķējumu. Ja rodas neskaidrības, konsultēties ar pārdevēju.



Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, starp 0°C un 40°C

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma.
Izgatavošanas datums:
Partijas numurs:



LV04/2020315

Produkts piemērots lietošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar EK regulu Nr. 834/2007 un 889/2008, un atbilstoši NOP noteikumiem. Kontroli veic EKOSERT SA F-32600.