

tradebor®



Darbīgā viela: boretanolamīns

Forma: šķīdums

Klasifikācija: EK mēslojums

Krāsa: brūna

1 proc. šķīduma pH līmenis: 7,5

1 proc. šķīduma blīvums: 1,4 g/cm³

IEPAKOJUMS

20 l

210 l

BORA LAPU MĒSLOJUMS ETANOLAMĪNA FORMĀ.

KĪMISKAIS SASTĀVS

	saturs, %	tilpums, %	g/l
Bora etanolamīns (B)	11,0	15,4	154,0

APRAKSTS

Tradebor ir koncentrēts bora lapu mēslojums boretanolamīna formā, šķīduma koncentrāts.

Bors etanolamīna formā ir ūdenī ātri šķīstošs un augiem viegli uzņemams. Mēslojums ātri iekļūst augā un pakāpeniski izmantojas.

Augiem bieži novērojams bora trūkums, jo augsnē esošais bors parasti ir augiem grūti uzņemamā formā. Vizuāli pamanītas bora trūkuma pazīmes liecina par jau novēlotu un mazāk efektīvu mēslošanas līdzekļa lietošanu.

Tradebor ieteicams lietot boru prasīgiem kultūraugiem profilaktiski vai visiem kultūraugiem, lai ātri un efektīvi novērstu bora trūkumu. Bors augā ir mazkustīgs, tāpēc lietojamo devu ieteicams sadalīt uz vairākām lietošanas reizēm.

Mēslojumu ieteicams lietot maisījumā ar citiem mēslošanas līdzekļiem un augu aizsardzības līdzekļiem.

Tvertnes maisījuma sagatavošana: pirms lietošanas sakratīt. Savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažādiem mēslošanas līdzekļiem. Iepildiet 2/3 no nepieciešamā ūdens daudzuma, ielēdziet maisītāju, pievienojiet *Tradebor*. Pievienojiet citus mēslošanas līdzekļus vai augu aizsardzības līdzekļus un atlikušo ūdens daudzumu. Darba šķidrums uzreiz izlietojiet. Ilgi maisīts darba šķidrums var homogenizēties. Maisījumā nav vēlams jaukt vairāk par diviem komponentiem. Nejaukt ar *Tradecorp AZ*. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI		
KULTŪRAUGI	DEVA	LIETOŠANA
Smidzināšanai uz lapām		
Rapsis	1,0-2,0 l/ha	lieto 2-4 reizes sezonā profilaktiski – rudenī maisījumā ar augu aizsardzības līdzekļiem, pavasarī ieteicams lietot, atsākoties intensīvai augšanai un pirms ziedpumpuru veidošanās stadijas;
Dārzeni	1,0-2,0 l/ha	lieto 8-10 lapu attīstības stadijā;
Zemenes	1,0l/ha	lieto ziedēšanas sākumā;
Kartupeļi	0,75-1,0 l/ha	lieto 1-2 reizes. Pirmo smidzinājumu veikt, kad kartupeļu laksti sasnieguši 15-20 cm augumu, smidzināšanu atkārtot pēc 15 dienām;
Kāposti, burkāni	1,0 l/ha	lieto 2 reizes pēc bora vidēji prasīgiem augiem;
	1,5 l/ha	lieto 3 reizes nelabvēlīgos augšanas apstākļos;
Augļu koki, ogulāji	1,0-2,0 l/ha	lieto pumpuru veidošanās stadijā vai augļu veidošanās stadijā.

Piezīme: Ieteicamais darba šķidruma daudzums 150-400 l/ha.

TRADEBOR IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:

- meristēmas attīstības stimulēšanai;
- lai paātrinātu ogļhidrātu apmaiņu;
- nukleīnskābju sintēzei;
- bagātīgai augu ziedēšanai un ziedputekšņu produktivitātei;
- rapša ražas kvantitātei (vairāk pākšu, tajās vairāk sēklu);
- cukuru uzkrāšanai augos;
- lai stiprinātu rapša ziemotspēju.