



Darbīgā viela: dzelzs, cinka, mangāna, vara (Fe-Zn-Mn-Cu-EDTA) helāti, bors, molibdēns

Forma: šķīstošas mikrogranulas

Klasifikācija: EK mēslojums

Krāsa: zaļa

Šķīdība 200 g/l

pH stabilitāte: 3-9

1 proc. šķīduma pH līmenis: 3,2

1 proc. šķīduma blīvums: 0,5 g/cm³

IEPAKOJUMS:



ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠS KOMPLEKSS HELĀTU MAISIJUMS.

KĪMISKAIS SASTĀVS

	saturs,%	g/kg
Dzelzs (Fe), 100% EDTA helāts	7,5	75
Mangāns (Mn), 100% EDTA helāts	3,5	35
Cinks (Zn), 100% EDTA helāts	0,7	7,0
Varš (Cu), 100% EDTA helāts	0,28	2,8
Bors (B)	0,65	6,5
Molibdēns (Mo)	0,3	3,0

APRAKSTS

Tradecorp AZ ir ūdenī viegli šķīstošs un efektīvs komplekss mikroelementu mēslojums. Mēslojuma sastāvā esošais dzelzs, cinks, mangāns un varš ir 100% EDTA helāti.

Tradecorp ražoto helātu priekšrocība ir šķīdība, blīvums, krāsa un helātu mikrogranulas formas viendabība.

Tradecorp AZ ir piemērots visu kultūraugu papildmēslošanai caur augsni, caur lapām vai lietošanai laistīšanas sistēmās. Mēslojumu lieto profilaktiski vai efektīvai mikroelementu trūkuma novēršanai.

Tvertnes maisījuma sagatavošana: savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažādiem mēslošanas līdzekļiem, tostarp arī ar citiem *Tradecorp* EDTA helatizētiem mēslojumiem: *Tradecorp Mn*, *Tradecorp Zn* u. c. Nav ieteicams jaukt ar izteikti sārmainiem (pH >8), sēra, organiskajiem vara savienojumiem. Nejaukt ar *Aton Ca*, *Aton Fe*. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI		
KULTŪRAUGI	DEVA	LIETOŠANA
Hidroponikā vai laistīšanas sistēmās		
Straujai augu attīstībai laistot vai lietojot hidroponikā	2,0-3,0 kg/ha (2-3 g/ūdens 100 l)	mēslošanu atkārtoti ik pēc 7-10 dienām visu veģetācijas periodu;
	20-40 g/ūdens 10 l	laistīšanu atkārtoti ik pēc 10-15 dienām visu veģetācijas periodu;
Smidzināšanai uz lapām		
Graudaugi	0,5-1,0 kg/ha	ieteicams lietot cerošanas stadijā, 1.-2. mezgla attīstības un karoglapas attīstības stadijā;
Rapsis	0,5-1,0 kg/ha	ieteicams lietot agrīnās attīstības stadijās un pirms ziedēšanas sākuma;
Kartupeļi	1,0 kg/ha	ieteicams lietot divas reizes bumbuļu aizmešanās stadijā, smidzināšanu atkārtojot pēc 7-10 dienām;
Augļu koki un ogulāji	1,0-2,0 kg/ha	ieteicams lietot 4-5 reizes: pirms un pēc ziedēšanas un augļu nobriešanas stadijā.

Piezīme: ieteicamais darba šķidrums daudzums 200-400 l/ha.

TRADECORP AZ IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:

- sabalansētai laukaugu papildmēslošanai;
- nepārtrauktas vielmaiņas nodrošināšanai;
- intensīvas fotosintēzes nodrošināšanai;
- labai ražas kvalitātei;
- lietošanai laistīšanas sistēmās un hidroponikās.