

# tradecorp® Zn



**Darbīgā viela:** cinka helāts (Zn-EDTA)

**Forma:** šķīstošas mikrogranulas

**Klasifikācija:** EK mēslojums

**Krāsa:** balta

**Šķīdība** 200 g/l

**pH stabilitāte:** 4-9

**1 proc. šķīduma pH līmenis:** 6,5

**1 proc. šķīduma blīvums:** 0,7 g/cm<sup>3</sup>

## IEPAKOJUMS:

15 kg

## ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠS CINKA HELĀTS.

### ĶĪMISKAIS SASTĀVS

	saturs, %	g/kg
Cinks (Zn), šķīstošs ūdenī	14,0	140
Cinka helāts (Zn), 100% EDTA	14,0	140

### APRAKSTS

*Tradecorp Zn* ir ūdenī viegli šķīstošs un efektīvs cinka (Zn) helāts, 100% EDTA.

*Tradecorp* ražoto helātu priekšrocība ir šķīdība, blīvums, krāsa un helātu mikrogranulas formas viendabība.

*Tradecorp Zn* ir piemērots visu kultūraugu, bet īpaši kukurūzas, tauriņziežu, pākšaugu un kartupeļu papildmēslošanai caur augsni, caur lapām vai lietošanai laistīšanas sistēmās. Mēslojumu lieto efektīva un ātra cinka trūkuma novēršanai vai profilaktiski, pirms redzamas trūkuma pazīmes.

Graudaugiem cinks ir nepieciešams cerošanas un 4-6 lapu attīstības stadijās. Mēslojumu ieteicams lietot kopā ar šķīdrijiem slāpekļa mēslojumiem KAS, citiem mēslošanas līdzekļiem un augu aizsardzības līdzekļiem.

**Tvertnes maisījuma sagatavošana:** savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažādiem mēslošanas līdzekļiem, tostarp arī ar citiem *Tradecorp* EDTA helatizētiem mēslojumiem: *Tradecorp Mn*, *Tradecorp AZ* u. c. Nav ieteicams jaukt ar izteikti skābiem (pH <4) preparātiem, minerāleļļām, sēru, organiskajiem vara savienojumiem. Nejaukt ar *Aton Ca*, *Aton Fe*. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI		
KULTŪRAUGI	DEVA	LIETOŠANA
Smidzināšanai uz lapām		
Graudaugi, iesala mieži	0,5-1,5 kg/ha	ieteicams lietot 1-2 reizes augu agrīnās attīstības stadijās ar 7-10 dienu intervālu, ieteicams jaukt ar mangānu saturošiem mēslojumiem, piemēram, <i>Tradecorp Zn</i> 0,3 kg/ha + <i>Tradecorp Mn</i> 0,3 kg/ha. Pirmo smidzināšanu veic cerošanas stadijā kopā ar herbicīdu, bet otro - 1.-2. mezgla attīstības stadijā kopā ar fungicīdu vai augšanas regulatoru;
Kukurūza	1,0-2,0 kg/ha	ieteicams smidzināt uz augsnes vai lapām 4-6 lapu attīstības stadijā. Ieteicams lietot kopā ar herbicīdiem.

**Piezīme:** Ieteicamais darba šķidruma daudzums 200-400 l/ha.

### TRADECORP Zn IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:

- efektīvai cinka deficīta novēršanai visiem kultūraugiem;
- nukleīnskābju sintēzei (šūnu dalīšanās procesiem);
- aktīvas fotosintēzes un fermentu darbības nodrošināšanai;
- efektīvai slāpekļa uzņemšanai;
- auksīnu (augu hormonu) vielmaiņai;
- ražas kvantitātei un kvalitātei;
- miežiem iesala ekstrakta veidošanai.