

# ORGANISKO SKĀBJU KONSERVANTU PIELIETOŠANA

	SKĀBBARĪBAI			TMR	PLACINĀTIEM GRAUDIEM		VESELIEM GRAUDIEM	
Sausnes saturs % (mitrums %)	17-25	25-45	40-80	neatkarīgi	55-70 (30-15)	70-84 (30-16)	70-85 (30-15)	75-85 (25-15)
	Tikko pļauta zāle, tauriņzieži	Vītināta zāle/ kukurūza	Skābsiens	-	Ar augstu mitruma saturu	Ar zemu mitruma saturu	Ar augstu mitruma saturu	Ar zemu mitruma saturu
<b>AIV® 2 Plus Na</b>	Optimālais variants	Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu			Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu			
<b>AIV® Āssā Na</b>	Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu	Optimālais variants	Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu			Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu		
<b>AIV® 2000 Plus Na</b>	Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu	Optimālais variants						
<b>AIV® Pro NC (Non ADR)</b>		Optimālais variants			Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu			
<b>Eastman Stabilizer Crimp (Non ADR)</b>					Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu			
<b>Eastman Propcorn NC (Non ADR)</b>			Optimālais variants					
<b>Eastman Propcorn Plus</b>			Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu					



Optimālais variants, ražotāja rekomendēts pielietojums pie pamatdevas



Efektīvs, bet ar augstāku pielikumu